

	โรงพยาบาลเวียงแหง	รหัส SOP-PHAR-006 Version 1	ออกโดย เภสัชกรรม
	แนวทางการใช้ยาต้านเอชไอวีบนหอผู้ป่วยใน	ประกาศวันที่ 21/11/2565	เขียนโดย : อัญมณี ชนะอุดมพร เภสัชกร
ตรวจสอบ :  รติพงศ์ สิริลักษณ์ (หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม)	อนุมัติ :  พิชิตสุวณ อยุธยา (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแหง)		

แนวทางการใช้ยาต้านเอชไอวีบนหอผู้ป่วยใน

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อป้องกันการทานยาไม่ตรงตามเวลาที่ผู้ป่วยทานอยู่
- 1.2 เพื่อให้คำปรึกษาเรื่องการทานยาด้านเอชไอวี ในกรณีที่ผู้ป่วยเริ่มใช้ยาเป็นครั้งแรกบนหอผู้ป่วยใน

2. ขอบเขต

เป็นแนวปฏิบัติสำหรับการบริหารยาให้กับผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับยาด้านเอชไอวีขณะนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

3. ผู้รับผิดชอบ

เภสัชกร/เจ้าพนักงานเภสัชกรรม/พนักงานเภสัชกรรม

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1 กรณีผู้ป่วยรับยาด้านเอชไอวีรายใหม่

- 4.1.1 เมื่อมีคำสั่งให้เริ่มใช้ยาด้านเอชไอวี จะทำการจ่ายยาด้านเอชไอวีให้ผู้ป่วยขณะทันตแพทย์รักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นรายวัน ซึ่งจะมีการระบุเวลาที่ผู้ป่วยทานยาในฉลากยารักษาตัว
- 4.1.2 เภสัชกรให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทานยา เหตุผลที่ต้องทานยา ความสำคัญของการทานยาสม่ำเสมอและตรงเวลา เพื่อให้ผู้ป่วยตระหนักถึงประโยชน์ของการทานยา รวมถึงช่วงเวลาในการทานยาให้กับผู้ป่วย
- 4.1.3 พยาบาลบริหารยาให้กับผู้ป่วย โดยจะนำยาไปจ่ายตามเวลาที่ระบุในใบ MAR และฉลากยาของผู้ป่วย
- 4.1.4 เมื่อผู้ป่วย discharge เภสัชกรส่งมอบยาให้กับผู้ป่วย และทบทวนวิธีการใช้ยาด้านเอชไอวี

4.2 กรณีผู้ป่วยเดิมที่เคยได้รับยาด้านเอชไอวี

- 4.2.1 เมื่อมีคำสั่งใช้ยาต้านเอชไอวีเดิม จะต้องทบทวนประวัติยาเดิมของผู้ป่วย เทียบกับใบสั่งยา พร้อมทั้งระบุเวลาที่ผู้ป่วยทานยาในฉลากยา
- 4.2.2 สอบถามผู้ป่วยว่านำยามาโรงพยาบาลหรือไม่ หากผู้ป่วยนำยามาจะต้องสอบถามวิธีการทานยา เพื่อตรวจสอบว่าที่ผ่านมาผู้ป่วยใช้ยาได้ถูกต้องหรือไม่ จากนั้นนำยาของผู้ป่วยมานับจำนวนยาที่เหลือ แล้วจ่ายยาให้ผู้ป่วยเป็นรายวัน
- 4.2.3 พยาบาลบริหารยาให้กับผู้ป่วย โดยจะนำยาไปจ่ายตามเวลาที่ระบุในใบ MAR และฉลากยาของผู้ป่วย
- 4.2.4 เมื่อผู้ป่วย discharge เกสซ์กรส่งมอบยาให้กับผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยา

5. แผนภาพ การจ่ายยาต้านเอชไอวีบนหอผู้ป่วยใน
กรณีผู้ป่วยรับยาต้านเอชไอวีรายใหม่

ผู้รับผิดชอบ

เมื่อมีคำสั่งเริ่มใช้ยาต้านเอชไอวี จะทำการจ่ายยาต้านเอชไอวี
เป็นรายวัน พร้อมทั้งระบุเวลาที่ผู้ป่วยทานยาในฉลากยา

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม/
พนักงานเภสัชกรรม

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทานยา เหตุผลที่ต้องทานยา ความสำคัญของการ
ทานยาสม่ำเสมอและตรงเวลา รวมถึงตั้งเวลาในการทานยาให้กับผู้ป่วย

เภสัชกร

บริหารยาให้กับผู้ป่วย โดยจะนำยาไปจ่ายตามเวลา
ที่ระบุในใบ MAR และฉลากยาของผู้ป่วย

พยาบาล


ผู้ป่วย D/C

เภสัชกรส่งมอบยาให้กับผู้ป่วย และทบทวน
วิธีการใช้ยาต้านเอชไอวี

เภสัชกร

กรณีผู้ป่วยเดิมที่เคยได้รับยาต้านเอชไอวี

ผู้รับผิดชอบ



6. ตัวชี้วัด

5.1 ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านเอชไอวีที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลได้รับการให้คำปรึกษาจากเภสัชกรร้อยละ 100

5.2 ผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้รับยาต้านเอชไอวี เมื่อ discharge ให้ความร่วมมือในการใช้ยาร้อยละ 100

ร้อยละความร่วมมือในการใช้ยา =
$$\frac{(\text{จำนวนยาที่ให้ผู้ป่วยในครั้งก่อน} - \text{จำนวนยาที่เหลือ}) \times 100}{\text{จำนวนยาที่ทานต่อวัน} \times \text{จำนวนวันที่ให้ยาไปทาน}}$$