

	โรงพยาบาลเวียงแหง	รหัส SOP-PHAR-001 Version 1	ออกโดย เภสัชกรรม
	การป้องกันการแพ้ยาสำหรับผู้ป่วยใน	ประกาศวันที่ 07/10/2565	เขียนโดย : ปณต อัครวิวัฒน์พงศ์ เภสัชกรปฏิบัติการ
ตรวจสอบ :  จิติพงศ์ ศิริลักษณ์ (หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม)	อนุมัติ :  พิชิตรัฐภูมิ อยุทธ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแหง)		

การป้องกันการแพ้ยาสำหรับผู้ป่วยใน (IPD)

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพ้ยาในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษารูปแบบผู้ป่วยใน (IPD) และมีประวัติการแพ้ยาอยู่เดิม

2. ขอบเขต

ใช้เป็นระเบียบปฏิบัติสำหรับการดำเนินงาน การป้องกันการแพ้ยาสำหรับผู้ป่วยใน (IPD) ทุกรายตั้งแต่เริ่มเข้ารับการรักษารูปแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลจนถึงสิ้นสุดกระบวนการการรักษารักษา

3. นิยามและคำย่อ

3.1 การแพ้ยาหมายถึง เหตุการณ์ที่ผู้ป่วยได้รับยาที่มีชื่อสามัญทางยาเดียวกันกับยาที่เคยมีประวัติแพ้ แล้วเกิดอาการแพ้ขึ้น เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์และระบบของโรงพยาบาล ยกเว้นการตั้งใจให้ยาซ้ำ (Rechallenge) ของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์ในการรักษาหรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

3.2 ผู้ป่วยใน (In-Patient Department :IPD) หมายถึง ผู้ป่วยในที่เข้ารับการรักษารักษาและต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 คณะกรรมการ PCT โรงพยาบาลเวียงแหง เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายในการดำเนินการ การป้องกันการแพ้ยาสำหรับผู้ป่วยใน (IPD)

4.2 แพทย์ เป็นผู้รับผิดชอบ

4.2.1 สอบถาม ติดตามประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วย

4.2.2 สั่งใช้ยาโดยคำนึงถึงประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วย

4.3 เภสัชกร/เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เป็นผู้รับผิดชอบ

4.3.1 สอบถาม สืบหา ติดตามประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วย

4.3.2 คัดกรองคำสั่งใช้ยา โดยเปรียบเทียบกับประวัติแพ้ยาของผู้ป่วย

4.3.3 จัดทำสัญลักษณ์แจ้งเตือน (trigger) การแพ้ยา

4.4 พยาบาล เป็นผู้รับผิดชอบ

4.4.1 สอบถาม ติดตามประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วย

4.4.2 จัดทำสัญลักษณ์แจ้งเตือน (trigger) การแพ้ยา

5. ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ฝ่ายเภสัชกรรมทบทวนประวัติแพ้ยาจากฐานข้อมูล HIS และซักประวัติแพ้ยาจากผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย ก่อนผู้ป่วย admit
2. ในกรณีผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา ให้ฝ่ายเภสัชกรรม แนบสติ๊กเกอร์ผู้ป่วยแพ้ยาสีชมพู โดยระบุชื่อยาในสติ๊กเกอร์อย่างชัดเจน
3. ฝ่ายเภสัชกรรม ใช้ตารางเฝ้าระวังการแพ้ยา ประทับที่ใบสั่งยา (Doctor's order sheet) แผ่นแรก ด้วยหมึกสีแดง
4. พยาบาลประจำหอผู้ป่วยติดสติ๊กเกอร์ผู้ป่วยแพ้ยาที่ชาร์ตเหล็ก
5. พยาบาลประจำหอผู้ป่วยใช้ตารางเฝ้าระวังการแพ้ยา ประทับที่ใบสั่งยา (Doctor's order sheet) ทุกแผ่นด้วยหมึกสีแดง

Flow chart

